

## BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

### Mastu S forte végbélkúp

**Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót.**

- *E recept nélkül kapható gyógyszerrel Ön enyhe, múltó panaszokat kezelhet orvosi felügyelet nélkül. Az optimális hatás érdekében azonban, elengedhetetlen e gyógyszer körültekintő, szakszerű alkalmazása.*
- *Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.*
- *További kérdéseivel forduljon gyógyszerészéhez.*
- *Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei 8-10 napon belül nem enyhülnek vagy éppen súlyosbodnak.*

#### **A betegtájékoztató tartalma:**

1. Milyen betegségek esetén alkalmazható a Mastu S forte végbélkúp?
2. Tudnivalók a készítmény alkalmazása előtt
3. Hogyan kell alkalmazni a végbélkúpot?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Tárolás

Hatóanyag: 250 mg bufexamák, 100 mg titán-dioxid (E171), 100 mg bázisos bizmut-gallát, 10,0 mg lidokain-hidroklorid-monohidrát végbélkúponként.

Segédanyagok: szilárd zsír

Gyártó és a forgalomba hozatali engedély jogosultja: STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel, Németország

#### **1. MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ A MASTU S FORTE VÉGBÉLKÚP?**

Aranyér kezelésére szolgáló készítmény. A Mastu S forte végbélkúp I. és II. fokú aranyér, végbélrepedések, akut és krónikus végbél körüli ekcéma, a végbélnyílás és a végbél területén jelentkező gyulladásos folyamatok (proctitis) kezelésére szolgál.

#### **2. TUDNIVALÓK A KÉSZÍTMÉNY ALKALMAZÁSA ELŐTT**

##### **Ne alkalmazza a készítményt:**

- ha túlérzékeny a készítmény hatóanyagára vagy bármely segédanyagára
- bizonyos bőrfolyamatok (szifilisz, tuberkulózis) esetén.

##### **Terhesség, szoptatás**

Amennyiben terhes vagy szoptat, keresse fel kezelőorvosát, aki egyedileg fogja elbírálni a készítmény alkalmazhatóságát.

**A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek üzemeltetéséhez szükséges képességekre**  
Fenti képességeket a készítmény nem befolyásolja.

##### **A kezelés ideje alatt szedett egyéb gyógyszerek:**

Gyógyszerkölsönhatások jelenleg nem ismertek.

Mastu készítmények és gumióvszer egyidejű használata esetén a szakítószilárdság csökkenhet és ez befolyásolhatja a gumióvszer biztonságát.

### 3. HOGYAN KELL ALKALMAZNI A VÉGBÉLKÚPOT?

Az alábbi útmutatás akkor érvényes, ha orvosa másképp nem rendelte a készítményt. Tartsa be az előírást, különben a Mastu S forte végbélkúp nem hat megfelelőképpen.

Naponta 2-szer 1 kúpot kell – lehetőleg székletürítés után – a végbélnyílásba felhelyezni. A panaszok csökkenése után elegendő naponta 1 végbélkúp.

A Mastu S forte végbélkúpot a heveny tünetek csökkenéséig kell alkalmazni. A kezelés sikerének biztosítása érdekében további 8-10 napos kezelés javasolt. Ha hosszabb ideig való alkalmazásra van szükség, akkor helyi érzéstelenítőt nem tartalmazó készítményt kell választani.

Gyermek- és fiatal korban való alkalmazására vonatkozóan nem állnak rendelkezésre klinikai tapasztalatok.

Használja a Mastu S forte végbélkúpot az adagolási utasítás szerint. Ha úgy érzi, hogy a készítmény nem csillapítja kellő mértékben a fájdalmat, ne növelje az adagot, hanem forduljon orvoshoz.

#### **Ha adagját elfelejtette alkalmazni:**

Következő alkalommal ne használjon dupla adagot, mert ezzel már nem pótolja a kiesett mennyiséget, viszont a túladagolás veszélyének tenné ki magát.

### 4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

Mint minden gyógyszernek, a Mastu végbélkúpnak is lehetnek mellékhatásai.

A készítmény bármely összetevőjével szembeni túlérzékenység, ami általában helyi izgalmi tünetekben nyilvánul meg (pír, égető érzés, viszketés). Ritkán a folyamat a kezeletlen bőrfelületre is ráterjedhet, s hólyagképződéssel járó bőrduzzanat, nedvedzés, pikkelyképződés, valamint csalánkiütés alakulhat ki. Ritkán ezek a tünetek erősebb formában is megjelenhetnek, és egyes esetekben nagyobb bőrfelületre is kiterjedhetnek.

Túlérzékenységi reakciók, valamint a bőrbetegség akut romlása esetén a gyógyszer alkalmazását fel kell függeszteni, és orvoshoz kell fordulni.

Ha olyan mellékhatást észlel, ami ebben a tájékoztatóban nem szerepel, forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez.

### 5. TÁROLÁS

Legfeljebb 25°C -on tárolandó.

A készítmény csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül használható fel.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó.

OGYI-T-7620/01

**A betegtájékoztató engedélyezésének dátuma:** 2009. december 30.